



Deltavet

INNOVACION Y DESARROLLO EN MEDICINA VETERINARIA

Condroitin 10

Intraarticular

Condroitin Sulfato "A" 10 %

Equinos

Composición:

Cada frasco ampolla contiene: Condroitin Sulfato "A" 0,2 g
Excipientes c.s.p. 2,0 ml

Administración y dosis: Aplicar 1 ó 2 ml por vía intraarticular según la articulación afectada, y repetir cada 7 días. Se podrán realizar hasta 5 aplicaciones dependiendo de la evolución de los síntomas. En todos los casos seguir el criterio profesional.

Inyectar el Condroitin 10 Intraarticular sin mezclar con otras drogas.

Indicaciones: Artrosis. Osteoartritis. Espondiloartrosis.
Condroprotección (uso prolongado de esteroides sistémicos).

Acción terapéutica: El Condroitin Sulfato "A" es uno de los principales componentes extracelulares del tejido cartilaginoso, cuya principal función es retener agua, lo que brinda elasticidad al tejido y permite la difusión de los elementos nutritivos necesarios para mantener la actividad biológica de los condrocitos. La pérdida cuali-cuantitativa de los glicosaminoglicanos de los cartílagos articulares está considerada la lesión bioquímica característica de las patologías articulares crónicas no infecciosas, manifestadas con lesiones de erosión, fisuración y desintegración de la sustancia fundamental.

El Condroitin 10 actúa sustituyendo la pérdida del Condroitin Sulfato "A", rehidratando al cartílago rápidamente, aliviando el dolor sin el uso de corticoides u otros analgésicos y mejorando notoriamente el estado clínico del paciente.

Presentación: Estuche conteniendo 1 frasco ampolla de 2 ml.

Precauciones y advertencias: Se deberá pelar, lavar y desinfectar cuidadosamente la zona de aplicación, con el mismo cuidado requerido para una cirugía intraarticular.

Retirar previamente líquido sinovial en igual cantidad que el producto a inyectar.

La solución no empleada de un frasco ampolla debe ser descartada.

Después de una inyección intraarticular pueden ocurrir reacciones hasta 48 horas posteriores a la aplicación.

Si se produjera una excesiva inflamación, se deberá suspender el tratamiento.

Conservar entre 5° y 25°, protegido de la luz.

Laboratorio Deltavet

Abel Costa 845 (1708) Morón Pcia. de Bs. As.

Tel./Fax: 629-5324

Director Técnico: Dr. Jorge Armando Dale - Médico Veterinario - Mat. Nacional N° 2907

Uso veterinario

Industria Argentina



Deltavet

INNOVACION Y DESARROLLO EN MEDICINA VETERINARIA

Condroitin 10

Intramuscular

Condroitin Sulfato "A" 10 %
Equinos

Composición:

Cada frasco ampolla contiene: Condroitin Sulfato "A" 0,5 g
Excipientes c.s.p. 5,0 ml

Administración y dosis: En caballos adultos, 5 ml por vía intramuscular, en potrillos 2,5 ml. Se recomienda una aplicación cada 72 horas durante 30 días.

Indicaciones: Artrosis. Osteoartritis. Espondiloartrosis.
Condroprotección (uso prolongado de esteroides sistémicos).
Entrenamiento intenso en caballos de deporte.

Acción terapéutica: El Condroitin Sulfato "A" es uno de los principales componentes extracelulares del tejido cartilaginoso, cuya principal función es retener agua, lo que brinda elasticidad al tejido y permite la difusión de los elementos nutritivos necesarios para mantener la actividad biológica de los condrocitos. La pérdida cuali-cuantitativa de los glicosaminoglicanos de los cartilagos articulares está considerada la lesión bioquímica característica de las patologías articulares crónicas no infecciosas, manifestadas con lesiones de erosión, fisuración y desintegración de la sustancia fundamental.

El Condroitin 10 actúa sustituyendo la pérdida del Condroitin Sulfato "A", rehidratando al cartilago rápidamente, aliviando el dolor sin el uso de corticoides u otros analgésicos y mejorando notoriamente el estado clínico del paciente.

Presentación: Estuches conteniendo 1 y 4 frascos ampolla de 5 ml cada uno.



SENASA Certificado N° 97305
Establecimiento elaborador N° 6804

Laboratorio Deltavet

Abel Costa 845 (B1708JIO) Morón - Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Director Técnico: Dr. Jorge Armando Dale - Médico Veterinario
Mat. Nacional N° 2907

Comercializado en: Uruguay y Paraguay.

Distribuido en Chile por: CHEMIE S.A.

Av. El Totoral 601-A, Parque Industrial Buenaventura, Quilicura, Santiago de Chile.
Fono 7386525 - Fax 7386524 S.A.G.: Registro N° 1279

En Perú: SENASA Registro N° F.34.01.10006

En Venezuela, Importado y distribuido por: Servicios Clínicos Alianza C.A.

MPC-SASA N° M.I.
Asesor Técnico: Nerina Alliegro Morales

Uso veterinario

Industria Argentina